



ATLAMOX

POUDRE ORALE

COMPOSITION

Amoxicilline (s.f. trihydratée).....	10,00 g
Excipient q.s.p.....	100 g

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'**amoxicilline**, principe actif d'**ATLAMOX**, est un antibiotique du groupe des aminopénicillines très utilisé en médecine vétérinaire. L'amoxicilline est douée d'effets bactéricides vis à vis de nombreux germes pathogènes chez les espèces cibles. L'amoxicilline présente des propriétés pharmacocinétiques excellentes : résistance en pH acide digestif, bonne absorption digestive et bonne diffusion tissulaire. Le temps de demi-vie plasmatique de l'amoxicilline est relativement court, il en résulte un délai d'attente relativement court.

ESPECES CIBLES

Volailles et veau pré-ruminant.

INDICATIONS

Infections à germes sensibles à l'amoxicilline chez les espèces cibles, **ATLAMOX** est notamment indiqué pour le traitement des colibacillooses, des salmonelloses, des infections respiratoires, des entérites infectieuses et des staphylococcies.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale dans l'eau de boisson ou dans la ration alimentaire.

Volailles : 1,00 g de poudre/10 kg de poids vif ou un sachet de 100 g d'**ATLAMOX** par 1000 kg une fois par jour pendant 3 à 5 jours. La dose peut être répartie en deux prises espacées de 12 heures. A titre indicatif, **ATLAMOX** est à utiliser dans l'eau de boisson à raison de 1 sachet de 100 g/100 litres d'eau ou 1 sachet de 1 kg/tonne d'eau.

Veau pré-ruminant : 1,00 g de poudre/10 kg/jour pendant 3 à 5 jours. La dose journalière peut être répartie en deux prises à 12 heures d'intervalle. Le produit est à administrer après dilution dans l'eau ou dans l'aliment d'allaitement.



CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Hypersensibilités aux pénicillines.

Ne pas utiliser chez les poules pondeuses dont les produits sont destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez le lapin et les rongeurs.

Ne pas associer aux antibactériens bactériostatiques

EFFETS SECONDAIRES

Si les doses sont respectées, aucun effet secondaire n'est observé chez les espèces cibles.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Cette poudre soluble pour préparation buvable est destinée à être dissoute dans l'aliment liquide ou l'eau et ne peut pas être utilisée en l'état.

Bien respecter la dose chez les animaux déshydratés

Eviter la manipulation de ce produit en cas d'allergie connue à l'amoxicilline.

Manipuler ce produit en prenant des précautions afin d'éviter tout risque d'exposition.

Eviter de respirer les poussières et éviter le contact avec la peau et les yeux.

DELAI D'ATTENTE

Viande et abats : 48 heures

Œufs : Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Sachets de 1 Kg