



EQUIPAZ

SUSPENSION ORALE

COMPOSITION

Ivermectine.....	0,50 g
Praziquantel.....	2,50 g
Excipient q.s.p.....	100 ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'ivermectine, est un antiparasitaire de la famille des avermectines doué d'une grande activité aussi bien sur les parasites internes qu'externes des animaux domestiques. L'ivermectine agit sur les nématodes et sur les arthropodes par l'intermédiaire de l'acide gamma amino-butyrique (GABA). Elle provoque sa libération par la membrane pré-synaptique et potentialise sa liaison aux récepteurs situés sur la membrane post-synaptique. Aux doses recommandées, l'ivermectine est très bien tolérée aussi bien chez l'adulte que chez le jeune et peut être utilisée à tous les stades de gestation.

Cependant, l'ivermectine est dénuée d'activité cestocide. Ce qui oblige souvent à l'associer à des anthelminthiques ayant une activité ténicide.

Le praziquantel est un anthelminthique de la famille des pyrazino-isoquinolines très actif sur les ténias. Son action s'exerce aussi bien sur les formes adultes et immatures. Sur le plan pharmacologique, le praziquantel exerce son action de différentes manières dont notamment l'induction d'une contraction musculaire paralysante et la destruction du tégument du cestode. Il est rapidement absorbé par voie digestive chez toutes les espèces. Son métabolisme se fait de façon complète et rapide.

Les deux produits, ivermectine et praziquantel, présentent alors une complémentarité parfaite de leurs spectres d'action.

ESPECES CIBLES

Équidés

INDICATIONS

Traitement des nématodoses gastro-intestinales et pulmonaires et des cestodoses chez les équidés.



ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

EQUIPAZ est recommandé par voie orale à la dose unique de 4,00 ml de suspension/100 kg de poids vif, correspondant à 200 µg d'ivermectine et 1 mg de praziquantel par kg de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser chez les poulains âgés de moins de 5 mois.

Ne pas utiliser chez les chevaux de boucherie

EFFETS SECONDAIRES

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, aucun effet secondaire n'est observé.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas fumer ni manger au cours de l'utilisation du produit.

Bien se laver les mains après utilisation du produit.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Détruire le flacon après usage.

DELAI D'ATTENTE

Ne pas utiliser chez les chevaux de boucherie

CONDITIONS DE CONSERVATION

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

PRESENTATIONS

Flacons de 20 ml et 50 ml.