



ERYTHROFORT

POUDRE ORALE

COMPOSITION

Erythromycine (sf. thiocyanate).....	20,00 g
Excipient q.s.p.....	100 g

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'**érythromycine** est un antibiotique de la famille des macrolides doué d'une grande activité notamment sur les germes gram positif et les mycoplasmes. L'érythromycine est obtenue par culture d'une souche de streptomyces erythreus. C'est un antibiotique bactériostatique. Son mode d'action se traduit par l'inhibition de la synthèse protéique bactérienne.

L'érythromycine est bien absorbée par voie digestive chez les monogastriques et diffuse largement dans le poumon, le rein, le foie et la peau. L'érythromycine est éliminée essentiellement par voie biliaire après métabolisme hépatique.

ESPECES CIBLES

Volailles.

INDICATIONS

Infections à germes sensibles à l'Erythromycine. Il s'agit principalement du traitement et prévention des mycoplasmoses aviaires (primitives et MRC), du coryza infectieux, de la sinusite et synovite infectieuses chez la volaille.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale après dilution dans l'eau de boisson la dose de :

1,0 g/litre d'eau de boisson, soit un sachet de 1 kg/tonne d'eau.

La durée de traitement est de 5 jours.

Il est recommandé de faire une pré dilution du contenu du sachet dans 10 à 20 litres d'eau.

Eviter toute autre source d'abreuvement pendant la durée du traitement.



CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Hypersensibilité à l'Erythromycine.

Dysfonctionnement hépatique.

Ne pas administrer aux lapins

L'érythromycine peut être associée sans risques avec plusieurs autres antibactériens tels que : les tétracyclines, les aminosides et les sulfamides.

EFFETS SECONDAIRES

Si les doses et les contre indications sont respectées, aucun effet secondaire n'est observé chez les espèces cibles.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Bien respecter les posologies.

Garder le produit hors de la portée des enfants.

Garder le produit à une température n'excédant pas 25 °C et à l'abri de la lumière.

DELAI D'ATTENTE

Viande et abats : 3 jours

Œufs : 2 jours

CONDITIONS DE CONSERVATION

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Sachets de 500 g et 1 Kg