



ATLAMISOL 20 %

POUDRE ORALE

COMPOSITION

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Lévamisole (s.f. de Chlorhydrate)..... | 20,00 g |
| Excipient q.s.p..... | 100 g |

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le lévamisole est un anthélmintique de la famille des imidazothiazoles doué d'une grande activité sur les formes larvaires et adultes des strongles gastro-intestinaux et pulmonaires. Sa bonne biodisponibilité par voie digestive et son excellente diffusion tissulaire lui permettent d'atteindre les nématodes pulmonaires et les formes en hypobiose.

ESPECES CIBLES

Volailles, ovins, caprins, bovins.

INDICATIONS

Chez les **volailles** : traitement de la capillariose, l'hétérakidose, l'ascaridiose.

Chez les **ruminants** : traitement des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale.

Volailles : Dans l'eau de boisson à la dose de 20 mg de matière active par kg de poids vif ou 10 g de poudre/100 kg de poids vif.

Ruminants : 8 mg de matière active /kg ou 0,40 g de poudre/10 kg de poids vif. Dissoudre le contenu d'un sachet de 100 g dans 1 litre d'eau, bien agiter et administrer 4 ml/10 kg de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine et chez les poudeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les équidés.

Ne pas associer aux organophosphorés et aux spécialités contenant le citrate de diéthylcarbazine.



EFFETS SECONDAIRES

Des signes bénins et passagers tels que : agitation, miction, défécation et ptyalisme sont parfois observés après le traitement par des préparations à base de lévamisole.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Garder le produit hors de portée des enfants

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 7 jours.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Produit stable 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

PRESENTATIONS

Sachets de 100 g.