



BABICUR

SOLUTION INJECTABLE

COMPOSITION

Imidocarbe (s.f.dipropionate)	8,50 g
Excipient qsp.....	100ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'imidocarbe, dérivé carbanilide, a des propriétés à la fois babésicide et anaplasmodicide. Son mécanisme d'action est mal connu. Après pénétration active dans le parasite par des transporteurs protéiques de base puriques, il pourrait se comporter comme un inhibiteur des topo-isomérases de type II. Il bloque ainsi la réplication de l'ADN ; il pourrait également interférer avec la synthèse des polyamines par le parasite.

ESPECES CIBLES

Bovins et chiens.

INDICATIONS

Chez les bovins :

- Traitement et prophylaxie des babésioses, des anaplasmoses et des deux associées.

Chez les chiens :

- Traitement et prophylaxie de la babésiose.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voies intramusculaire ou sous cutanée.

Bovins :

- **Babésiose** : voie intramusculaire profonde ou sous cutanée dans l'encolure ou dans la croupe :

- Prévention : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à 2,5 ml de solution par 100 kg de poids vif.
- Traitement : 0,85 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à 1 ml par 100 kg de poids vif. Une seule injection est généralement suffisante.

- **Anaplasmosse bovine** :

- **Traitement** : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à 2,5 ml de solution pour 100 kg de poids vif.

Chiens :

- **Babésiose** : voie intramusculaire ou sous cutanée :

- **Prévention** : 4,25 mg d'imidocarbe par kg de poids corporel correspondant à 0,5 ml pour 10 kg de poids corporel. La durée de la prévention ne dépassera pas 4 à 6 semaines (chimio-prévention).



- **Traitement** : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids corporel correspondant à 0,25 ml pour 10 kg de poids corporel. Une seule injection est généralement suffisante.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

aucune

EFFETS SECONDAIRES

Des troubles digestifs (vomissements, coliques, hypersalivation), des troubles d'origine neuromusculaire (tremblements, convulsions, douleurs), ainsi que d'autres troubles plus généraux (hyperthermie, sudation et prostration) ont été observés chez les espèces cibles.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas administrer par voie intraveineuse.
- Respecter strictement les doses indiquées et éviter l'association avec d'autres babésicides.
- L'administration des doses élevées peut être douloureuse et provoquer des réactions de défense chez les animaux. Certains chiens sont particulièrement sensibles à cette douleur.
- Laver immédiatement avec de l'eau les éventuelles éclaboussures sur la peau et dans les yeux.
- Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation du produit.
- Porter des gants.
- Il faut veiller à éviter toute auto-injection accidentelle. En cas d'injection accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin.

DELAI D'ATTENTE

Viande et abats : 28 jours

Lait : 6 jours (12 traites)

CONDITIONS DE CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25°C.
- Stabilité après ouverture du contenant: 4 Semaines

PRESENTATIONS:

Flacons de 50 ml et 100 ml.